1989年全国高中数学联赛

(10月15日上午8：00—10：00)

一．选择题(本题满分30分，每小题5分)：

1．若A、B是锐角△ABC的两个内角，则复数

$$z=(\cos B-\sin A)+i(\sin B-\cos A)$$

在复平面内所对应的点位于(　　)

A．第一象限　　B．第二象限　　C．第三象限　　D．第四象限

2．函数$f(x)=\arctan x+\frac{1}{2}\arcsin x$的值域是(　　)

A．$(-\pi,\ \pi)$　　B．$[-\frac{3}{4}\pi,\ \frac{3}{4}\pi]$　　C．$(-\frac{3}{4}\pi,\ \frac{3}{4}\pi)$　　D．$[-\frac{1}{2}\pi,\ \frac{1}{2}\pi]$

3．对任意的函数$y=f(x)$，在同一个直角坐标系中，函数$y=f(x-1)$与函数$y=f(-x+1)$的图象恒(　　)

A．关于x轴对称　　B．关于直线$x=1$对称　　C．关于直线$x=-1$对称　　D．关于y轴对称

4．以长方体8个顶点中任意3个为顶点的所有三角形中，锐角三角形的个数为(　　)

A．0　　B．6　　C．8　　D．24

5．若

$$M=\{z\mid z=\frac{t}{1+t}+i\frac{1+t}{t},\ t\in R,\ t\neq -1,\ t\neq 0\},$$

$$N=\{z\mid z=\sqrt{2}[\cos(\arcsin t)+i\cos(\arccos t)],\ t\in R,\ |t|\leqslant 1\}.$$

则$M\cap N$中元素的个数为

A．0　　B．1　　C．2　　D．4

6．集合

$$M=\{u\mid u=12m+8n+4l,\ \text{其中 } m,\ n,\ l\in Z\}$$

$$N=\{u\mid u=20p+16q+12r,\ \text{其中 } p,\ q,\ r\in Z\}$$

的关系为

A．$M=N$　　B．$M\not\subset N$，$N\not\subset M$　　C．$M\subset N$　　D．$N\subset M$

三．填空题(本题满分30分，每小题5分)

1．若$\log_a\sqrt{2}<1$，则a的取值范围是_____.

2．已知直线l：$2x+y=10$，过点$(-10,0)$作直线$l'\perp l$，则l'与l的交点坐标为_____.

3．设函数$f_0(x)=|x|$，$f_1(x)=|f_0(x)-1|$，$f_2(x)=|f_1(x)-2|$，则函数$y=f_2(x)$的图象与x轴所围成图形中的封闭部分的面积是_____.

4．一个正数，若其小数部分、整数部分和其自身成等比数列，则该数为_____.

5．如果从数1，2，3，…，14中，按由小到大的顺序取出a_1，a_2，a_3，使同时满足

$$a_2-a_1\geqslant 3,\ \text{与}\ a_3-a_2\geqslant 3,$$

那么，所有符合上述要求的不同取法有_____种.

6．当s和t取遍所有实数时，则

$$(s+5-3|\cos t|)^2+(s-2|\sin t|)^2$$

所能达到的最小值为_____.

三．（本题满分 20 分）


已知 a_1，a_2，…，a_n是 n 个正数，满足

$$a_1\cdot a_2\cdot\cdots\cdot a_n=1.$$

求证：$(2+a_1)(2+a_2)\cdots(2+a_n)\geqslant 3^n$.

四．（本题满分 20 分）

已知正三棱锥 $S—ABC$ 的高 $SO=3$，底面边长为 6，过点 A 向其所对侧面 SBC 作垂线，垂足为 O，在 AO 上取一点 P，使 $\frac{AP}{PO}=8$，求经过点 P 且平行于底面的截面的面积.



五．（本题满分 20 分）

已知：对任意的 $n\in N^*$，有 $a_n>0$，且 $\sum_{j=1}^{n}a_j^3=(\sum_{j=1}^{n}a_j)^2$．求证：$a_n=n$.


第二试

（上午 10：30—12：30）

一．（本题满分 35 分）

已知　在 $\triangle ABC$ 中，$AB>AC$，$\angle A$ 的一个外角的平分线交 $\triangle ABC$ 的外接圆于点 E，过 E 作 $EF\perp AB$，垂足为 F.

求证　$2AF=AB-AC$.



二．（本题满分 35 分）

已知 $x_i\in R(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n;\ n\geqslant 2)$，满足

$$\sum_{i=1}^{n}|x_i|=1,\quad \sum_{i=1}^{n}x_i=0,$$

求证：$\left|\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{i}\right|\leqslant\frac{1}{2}-\frac{1}{2n}$.

三．（本题满分 35 分）

有 $n\times n$（$n\geqslant 4$）的一张空白方格表，在它的每一个方格内任意的填入+1 与-1 这两个数中的一个，现将表内 n 个两两既不同行（横）又不同列（竖）的方格中的数的乘积称为一个基

本项．试证明：按上述方式所填成的每一个方格表，它的全部基本项之和总能被 4 整除（即总能表示成 $4k$ 的形式，其中 $k\in\mathbb{Z}$）．

1989年全国高中数学联赛解答

第一试

一．选择题(本题满分30分，每小题5分)：

1．若A、B是锐角△ABC的两个内角，则复数

$$z=(\cos B-\sin A)+i(\sin B-\cos A)$$

在复平面内所对应的点位于(　　)

A．第一象限　　B．第二象限　　C．第三象限　　D．第四象限

【答案】B

【解析】$0°<A、B<90°<A+B<180°$．故$90°>A>90°-B>0°$，$\sin A>\cos B$，$\cos A<\sin B$．故$\cos B-\sin A<0$，$\sin B-\cos A>0$．点Z位于第二象限．选B

2．函数$f(x)=\arctan x+\frac{1}{2}\arcsin x$的值域是(　　)

A．$(-\pi,\ \pi)$　　B．$[-\frac{3}{4}\pi,\ \frac{3}{4}\pi]$　　C．$(-\frac{3}{4}\pi,\ \frac{3}{4}\pi)$　　D．$[-\frac{1}{2}\pi,\ \frac{1}{2}\pi]$

【答案】D

【解析】因$x\in[-1,\ 1]$，故$\arctan x\in[-\frac{\pi}{4},\ \frac{\pi}{4}]$，$\frac{1}{2}\arcsin x\in[-\frac{\pi}{4},\ \frac{\pi}{4}]$，且$f(-1)=-\frac{\pi}{2}$，$f(1)=\frac{\pi}{2}$．选$D$

3．对任意的函数$y=f(x)$，在同一个直角坐标系中，函数$y=f(x-1)$与函数$y=f(-x+1)$的图象恒(　　)

A．关于x轴对称　　B．关于直线$x=1$对称　　C．关于直线$x=-1$对称　　D．关于y轴对称

【答案】B

【解析】令$x-1=t$，则得$f(t)=f(-t)$，即$f(t)$关于$t=0$对称，即此二图象关于$x=1$对称．选B

4．以长方体8个顶点中任意3个为顶点的所有三角形中，锐角三角形的个数为(　　)

A．0　　B．6　　C．8　　D．24

【答案】C

【解析】以不相邻的4个顶点为顶点的四面体的8个面都是锐角三角形．其余的三角形都不是锐角三角形．选C.

5．若

$$M=\{z\mid z=\frac{t}{1+t}+i\frac{1+t}{t},\ t\in\mathrm{R},\ t\neq-1,\ t\neq0\},$$

$$N=\{z\mid z=\sqrt{2}[\cos(\arcsin t)+i\cos(\arccos t)],\ t\in\mathrm{R},\ |t|\leqslant1\}.$$

则$M\cap N$中元素的个数为

A．0　　B．1　　C．2　　D．4

【答案】A

【解析】M的图象为双曲线$xy=1(x\neq0,\ x\neq1)$$N$的图象为$x^2+y^2=2(x\geqslant0)$，二者无公共

点．选 A.

6．集合

$M=\{u \mid u=12m+8n+4l$，其中 m，n，$l \in Z\}$

$N=\{u \mid u=20p+16q+12r$，其中 p，q，$r \in Z\}$

的关系为

A. $M=N$　　B. $M \subset N$，$N \subset M$　　C. $M \subset N$　　D. $N \subset M$

【答案】A

【解析】$u=12m+8n+4l=4(3m+2n+l)$，由于 $3m+2n+l$ 可以取任意整数值，故 M 表示所有 4 的倍数的集合.

同理 $u=20p+16q+12r=4(5p+4q+3r)$ 也表示全体 4 的倍数的集合．于是 $M=N$.

三．填空题(本题满分 30 分，每小题 5 分)

1．若 $\log_a\sqrt{2}<1$，则 a 的取值范围是_____.

【答案】$(0,1)\cup(\sqrt{2},+\infty)$

【解析】若 $0<a<1$，则 $\log_a\sqrt{2}<0$，若 $a>1$，则得 $a>\sqrt{2}$．故填 $(0,1)\cup(\sqrt{2},+\infty)$

2.已知直线 l：$2x+y=10$，过点(－10,0)作直线 $l' \perp l$，则 l' 与 l 的交点坐标为_____.

【答案】(2，6)

【解析】直线 l' 方程为 $(x+10)-2y=0$，解得交点为(2，6).

3．设函数 $f_0(x)=|x|$，$f_1(x)=|f_0(x)-1|$，$f_2(x)=|f_1(x)-2|$，则函数 $y=f_2(x)$ 的图象与 x 轴所围成图形中的封闭部分的面积是_____.

【答案】7

【解析】 图 1 是函数 $f_0(x)=|x|$的图形，把此图形向下平行移动 1 个单位就得到函数 $f_0(x)=|x|-1$ 的图形，作该图形的在 x 轴下方的部分关于 x 轴的对称图形得出图 2，其中在 x 轴上方的部分即是 $f_1(x)=|f_0(x)-1|$的图象，再把该图象向下平行移动 2 个单位得到 $f_0(x)=|x|-2$ 的图象，作该图象在 x 轴下方的部分关于 x 轴的对称图形得到图 3，其中 x 轴上方的部分即是 $f_2(x)=|f_1(x)-2|$的图象．易得所求面积为 7．

4. 一个正数，若其小数部分、整数部分和其自身成等比数列，则该数为_____.




图1




图2




图3

【答案】$\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$

【解析】设其小数部分为 α $(0<\alpha<1)$，整数部分为 $n(n\in N+)$，则得， $\alpha(n+\alpha)=n^2$，

$\therefore$ $n^2<n+\alpha<n+1$.

$\therefore$ $\frac{1-\sqrt{5}}{2}<n<\frac{1+\sqrt{5}}{2}$，

但 $n\in N*$，故 $n=1$，得， $\alpha^2+\alpha-1=0$，

$\therefore$ $\alpha=\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$，

由 $\alpha>0$，知，$\alpha=\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$．$\therefore$ 原数为$\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$.

5．如果从数 1，2，3，…，14 中，按由小到大的顺序取出 a_1，a_2，a_3，使同时满足

$$a_2-a_1\geqslant 3，与\ a_3-a_2\geqslant 3，$$

那么，所有符合上述要求的不同取法有_____种．

【答案】120

【解析】令 $a_1'=a_1$，$a_2'=a_2-2$，$a_3'=a_3-4$，则得 $1\leqslant a_1'<a_2'<a_3'\leqslant 10$．所求取法为 $C_{10}^3=120$.

6．当 s 和 t 取遍所有实数时，则

$$(s+5-3|\cos t|)^2+(s-2|\sin t|)^2$$

所能达到的最小值为_____.

【答案】2

【解析】令 $x=3|\cos t|$，$y=2|\sin t|$，则得椭圆$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 在第一象限内的弧段．

再令 $x=s+5$，$y=s$，则得 $y=x-5$，表示一条直线．$(s+5-3|\cos t|)^2+(s-2|\sin t|)^2$表示椭圆弧段上点与直线上点距离平方．其最小值为点(3，0)与直线 $y=x-5$ 距离平方=2.

三．(本题满分 20 分)

已知 a_1，a_2，…，a_n 是 n 个正数，满足

$$a_1\cdot a_2\cdot\cdots\cdot a_n=1.$$

求证：$(2+a_1)(2+a_2)\cdots(2+a_n)\geqslant 3^n$.

【解析】证明：∵ $2+a_i=1+1+a_i\geqslant 3\sqrt[3]{a_i}$，$(i=1,2,\cdots,n)$

∴ $(2+a_1)(2+a_2)\cdots(2+a_n)=(1+1+a_1)(1+1+a_2)\cdots(1+1+a_n)\geqslant 3\sqrt[3]{a_1}\cdot 3\sqrt[3]{a_2}\cdot\cdots\cdot 3\sqrt[3]{a_n}\geqslant 3^n\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}=3^n$.

证法 2：$(2+a_1)(2+a_2)\cdots(2+a_n)=2^n+(a_1+a_2+\cdots+a_n)2^{n-1}+(a_1a_2+a_1a_3+\cdots+a_{n-1}a_n)2^{n-2}+\cdots+a_1a_2\cdots a_n$

但 $a_1+a_2+\cdots+a_n\geqslant n\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}=n=C_n^1$，

$a_1a_2+a_1a_3+\cdots+a_{n-1}a_n\geqslant C_n^2\sqrt[C_n^2]{(a_1a_2\cdots a_n)^{n-1}}=C_n^2$，……，


∴ $(2+a_1)(2+a_2)\cdots(2+a_n)=2^n+(a_1+a_2+\cdots+a_n)2^{n-1}+(a_1a_2+a_1a_3+\cdots+a_{n-1}a_n)2^{n-2}+\cdots+a_1a_2\cdots a_n$

$\geqslant 2^n+C_n^12^{n-1}+C_n^22^{n-2}+\cdots+C_n^1=(2+1)^n=3^n$.

四．（本题满分 20 分）

已知正三棱锥 $S—ABC$ 的高 $SO=3$，底面边长为 6，过点 A 向其所对侧面 SBC 作垂线，垂足为 O'，在 AO' 上取一点 P，使 $\frac{AP}{PO'}=8$，求经过点 P 且平行于底面的截面的面积．

【解析】正三棱锥 $S—ABC$ 的高为 SO，故 $AO\perp BC$，设 AO 交 BC 于 E，连 SE．则可证 $BC\perp$面 AES．故面 $AES\perp$面 SBC．



由 $AO'\perp$面 SBC 于 O'，则 AO' 在面 AES 内，O' 在 SE 上．AO' 与 SO 相交于点 F．


∵ ABC 为正三角形，$AB=6$，故 $AE=3\sqrt{3}$，$OE=\sqrt{3}$．

∵ $SO=3$，∴ $\tan\angle OES=\sqrt{3}$，$\angle E=60°$．

∴ $O'E=AE\cos 60°=\frac{3}{2}\sqrt{3}$．

作 $O'G\perp$平面 ABC，则垂足 G 在 AE 上．$O'G=O'E\sin 60°=\frac{9}{4}$．

∵ $\frac{AP}{PO'}=8$，∴ $\frac{PH}{O'G}=\frac{8}{9}$，$\Rightarrow PH=2$．



设过 P 与底面平行的截面面积为 s，截面与顶点 S 的距离 $=3-2=1$．

∴ $S_{\triangle ABC}=\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 6^2=9\sqrt{3}$．

∴ $\frac{s}{S_{\triangle ABC}}=(\frac{1}{3})^2$，故 $s=\sqrt{3}$．

五．（本题满分 20 分）

已知：对任意的 $n\in N^*$，有 $a_n>0$，且 $\sum_{j=1}^{n} a_j^3=(\sum_{j=1}^{n} a_j)^2$．求证：$a_n=n$．

【解析】证明：由已知，$a_1^3=a_1^2$，$a_1>0$，∴ $a_1=1$．

设 $n\leqslant k(k\in N,$ 且 $k\geqslant 1)$时，由 $\sum_{j=1}^{n} a_j^3=(\sum_{j=1}^{n} a_j)^2$ 成立可证 $a_k=k$ 成立．

当 $n=k+1$ 时，$\sum_{j=1}^{k+1} a_j^3=(\sum_{j=1}^{k+1} a_j)^2=(\sum_{j=1}^{k} a_j)^2+2a_{k+1}(\sum_{j=1}^{k} a_j)+a_{k+1}^2$．

即 $\frac{1}{4}k^2(k+1)^2+a_{k+1}^3=\frac{1}{4}k^2(k+1)^2+2a_{k+1}\cdot\frac{1}{2}k(k+1)+a_{k+1}^2$．

∴ $a_{k+1}^2-a_{k+1}-k(k+1)=0$，解此方程，得 $a_{k+1}=-k$ 或 $a_{k+1}=k+1$．由 $a_n>0$ 知，只有 $a_{k+1}=k+1$ 成立．

即 $n=k+1$ 时命题也成立．由数学归纳原理知对于一切 $n\in N^*$，$a_n=n$ 成立．

第二试

一．（本题满分 35 分）

已知　在 ΔABC 中，$AB>AC$，$\angle A$ 的一个外角的平分线交 ΔABC 的外接圆于点 E，过 E 作 $EF\perp AB$，垂足为 F.

求证　$2AF=AB-AC$.


【解析】证明：在 FB 上取 $FG=AF$，连 EG、EC、EB，

于是 ΔAEG 为等腰三角形，$\therefore EG=EA$.

又 $\angle 3=180°-\angle EGA=180°-\angle EAG=180°-\angle 5=\angle 4$.

$\angle 1=\angle 2$．于是 $\Delta EGB\cong\Delta EAC$．$\therefore BG=AC$，

故证



二．已知 $x_i\in R(i=1，2，\cdots，n；n\geqslant 2)$，满足

$$\sum_{i=1}^{n}|x_i|=1，\quad \sum_{i=1}^{n}x_i=0，$$

求证：$\left|\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{i}\right|\leqslant\frac{1}{2}-\frac{1}{2n}$.

【解析】证明：由已知可知，必有 $x_i>0$，也必有 $x_j<0(i，j\in\{1，2，\cdots，n\}$ 且 $i\neq j)$.

设 x_{i_1}，x_{i_2}，$\cdots$，x_{i_k} 为诸 x_i 中所有 >0 的数，x_{j_1}，x_{j_2}，$\cdots$，x_{j_m} 为诸 x_i 中所有 <0 的数．由已知得

$$X=x_{i_1}+x_{i_2}+\cdots+x_{i_k}=\frac{1}{2}，\quad Y=x_{j_1}+x_{j_2}+\cdots+x_{j_m}=-\frac{1}{2}.$$

于是当 $\sum_{l=1}^{k}\frac{x_{i_l}}{l}>-\sum_{h=1}^{m}\frac{x_{j_h}}{h}$ 时，$\left|\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{i}\right|=\sum_{l=1}^{k}\frac{x_{i_l}}{l}+\sum_{h=1}^{m}\frac{x_{j_h}}{h}\leqslant\sum_{l=1}^{k}x_{i_l}-\frac{1}{n}\sum_{h=1}^{m}x_{j_h}=\frac{X}{2}-\frac{-Y}{2}=\frac{1}{2}-\frac{1}{2n}$.

于是当 $\sum_{l=1}^{k}\frac{x_{i_l}}{l}<-\sum_{h=1}^{m}\frac{x_{j_h}}{h}$ 时，$\left|\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{i}\right|=-\sum_{l=1}^{k}\frac{x_{i_l}}{l}-\sum_{h=1}^{m}\frac{x_{j_h}}{h}\leqslant-\sum_{l=1}^{k}x_{i_l}-\frac{1}{n}\sum_{h=1}^{m}x_{j_h}=\frac{-Y}{2}-\frac{X}{2}=\frac{1}{2}$

$-\frac{1}{2n}$.

总之，$\left|\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{i}\right|\leqslant\frac{1}{2}-\frac{1}{2n}$成立.

三．有 $n\times n$（$n\geqslant 4$）的一张空白方格表，在它的每一个方格内任意的填入+1 与-1 这两个数中的一个，现将表内 n 个两两既不同行(横)又不同列(竖)的方格中的数的乘积称为一个基本项．试证明：按上述方式所填成的每一个方格表，它的全部基本项之和总能被 4 整除（即总能表示成 $4k$ 的形式，其中 $k\in Z$）.

【解析】证明 ：基本项共有 $n!$个，$n>3$，则基本项的个数为 4 的倍数，设共有 $4m$ 项．

其中每个数 $a_{ij}(=\pm 1)$都要在$(n-1)!$个基本项中出现，故把所有基本项乘起来后，每个 a_{ij}都乘了$(n-1)!$次，而 $n>3$，故$(n-1)!$为偶数，于是该乘积等于 1．这说明等于-1 的

基

本项有偶数个，同样，等于+1的基本项也有偶数个.

若等于－1的基本项有4l个，则等于+1的基本项有4n－4l个，其和为4n－4l－4l=4(n－2l)为4的倍数；

若等于－1的基本项有4l－2个，则等于+1的基本项有4n－4l+2个，其和为4n－4l+2－4l+2=4(n－2l+1)为4的倍数. 故证.